

# ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」を使用される患者さまへ

## 使用する際に注意すること

このお薬は5mLの容器に2.5mL入っています。

薬液が少なく見えますが、治療に必要な量は十分入っています。

**点 眼 前** 手をきれいに洗ってください。

**点 眼 時** 1日1回、1滴の点眼です。  
決められた点眼回数をお守りください。

※点眼後は目を閉じて、目頭(涙囊部)を1～5分間、指で軽く押さえてください。

※他の点眼薬も使用する場合には、5分間以上あけてから点眼してください。

※コンタクトレンズを使用している場合、レンズを外してから点眼し、

15分以上たってからレンズをつけてください。

## 点 眼 後

・点眼後、目からあふれた点眼液を皮膚についたまま放置しつづけると、少しづつ目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長く、太くなることがあります。

・点眼液が目のまわりについたときは、すぐにぬらしたティッシュやタオルでふき取るか、目を閉じて洗顔してください。洗顔前や入浴前に点眼することもおすすめです。



この点眼液は  
緑内障・高眼  
圧症を治療す  
るお薬です。



# ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」を使用される患者さまへ

## 点眼液の保管・取扱いで注意すること

- ・投薬袋に入れて、室温(1~30°C)で保管してください。
- ・開封後は4週間以内に使用し、残液は使用しないでください。

## その他の注意すること

- ・点眼後、目が赤くなることがあります、そのような症状が続く場合は医師または薬剤師にご相談ください。
- ・点眼により、しみる・かゆい・痛いなどの自覚症状が続く場合には、医師の診察を受けるようにしてください。
- ・点眼後、一時的に目がかすむことがあります。このような場合には、機械類の操作や自動車等の運転はしないようにしてください。
- ・自己判断で使用を中止したり、使用量を加減したりせずに、医師または薬剤師の指示どおりに使用してください。
- ・その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。