

医薬品の適正な使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

使用上の注意改訂のお知らせ

アドレナリン α_2 受容体作動薬
緑内障・高眼圧症治療剤
ブリモニジン酒石酸塩点眼液

ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「日点」

製造販売元：ロートニッテン株式会社

この度、標記製品の「使用上の注意」について、自主改訂を行いましたのでお知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂概要】

改訂項目	改訂概要
適用上の注意	患者に対する指導事項として記載されていた、「点眼に際しては、原則として仰臥位をとり、」を削除しました。

《裏面に改訂内容を記載しておりますのでご参照下さい。》

【改訂内容】（新旧対比表）

（ ___：改訂箇所）

改訂後(2022年11月改訂)	改訂前
<p>14. 適用上の注意</p> <p>14.1 薬剤交付時の注意</p> <p>患者に対し以下の点に注意するよう指導すること。</p> <ul style="list-style-type: none">・薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。・患眼を開瞼して結膜囊内に点眼し、1～5分間閉瞼して涙嚢部を圧迫させた後、開瞼すること。・他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼すること。	<p>14. 適用上の注意</p> <p>14.1 薬剤交付時の注意</p> <p>患者に対し以下の点に注意するよう指導すること。</p> <ul style="list-style-type: none">・薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。・<u>点眼に際しては、原則として仰臥位をとり</u>、患眼を開瞼して結膜囊内に点眼し、1～5分間閉瞼して涙嚢部を圧迫させた後、開瞼すること。・他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼すること。

【改訂理由】（自主改訂）

先発医薬品と記載を統一するため、自主改訂を行いました。

2019年4月1日から適用されている「医療用医薬品の添付文書等の記載要領」に関連する記載整備であり、特別な注意喚起を要するものではありません。

- DSU(医薬品安全対策情報)への掲載予定はございません。
- 改訂後の電子化された添付文書は以下のホームページに掲載されますので、ご参照ください。
 - ・弊社ホームページ (<https://www.rohto-nitten.co.jp/>)
 - ・医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)
- 添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」を使用して、以下のGS1バーコードを読み取ることで電子化された添付文書をご覧いただけます。



(01)04987421234916

〈お問い合わせ先〉

製造販売元

RN ロートニッテン株式会社
名古屋市南区桜本町40番地の2

<https://www.rohto-nitten.co.jp/>

信頼性保証部安全管理室

TEL 052-822-5771

<受付時間> 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)