

ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」を使用される患者さまへ

使用する際に注意すること

点眼前 手をきれいに洗ってください。

点眼時 1回1滴、1日2回の点眼です。
決められた点眼回数をお守りください。
容器の先が目やまぶた、まつ毛に触れない
ように、1滴点眼してください。
2回続けて点眼はしないでください。

点眼後

- ・点眼後は目を閉じて、目がしら(涙嚢部)を1～5分間、指で軽く押さえてください。
- ・点眼液が目のまわりについたときは、ティッシュや清潔なタオルでふき取ってください。

※他の点眼薬も使用する場合には、5分間以上あけてから点眼してください。



この点眼液は
緑内障・高眼
圧症を治療す
るお薬です。



ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」を使用される患者さまへ

点眼液の保管・取扱いで注意すること

- ・ 室温(1 ～ 30℃)で保管してください。
- ・ 開封後は4週間以内に使用し、残液は使用しないでください。

その他の注意すること

- ・ 点眼によって、目が赤くなる・しみる・かゆい・痛いなどの症状があらわれることがあります。このような症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- ・ この薬は、自己判断で使用を中止したり、使用量を加減したりすると病気が悪化することがあります。医師の指示どおりに使用し続けることが重要です。
- ・ この薬を使用している間は、眠気・めまい・目のかすみなどが起こることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作には十分注意してください。
- ・ その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。