

タフチモ®配合点眼液「日点」を使用される患者さまへ

使用する際に注意すること

このお薬は 5mL の容器に 2.5mL 入っています。
薬液が少なく見えますが、治療に必要な量は十分入っています。

点眼前 手をきれいに洗ってください。

点眼時 **1日1回、1滴の点眼です。**
決められた点眼回数をお守りください。

- ※容器の先が目やまぶた、まつ毛に触れないように注意して点眼してください。
- ※点眼後は目を閉じて、目頭（涙嚢部）を 1 ～ 5 分間、指で軽く押さえてください。
- ※他の点眼薬も使用する場合には、5 分間以上あけてから点眼してください。

点眼後

- ・点眼後、目からあふれた点眼液を皮膚についたまま放置しつづけると、少しずつ目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長く、太くなることがあります。
- ・点眼液が目のまわりについたときは、すぐにぬらしたティッシュやタオルでふき取るか、目を閉じて洗顔してください。洗顔前や入浴前に点眼することもおすすめです。



この点眼液は緑内障・高眼圧症を治療するお薬です。

- ・タフルプロスト
 - ・チモロールマレイン酸塩
- 2つの薬を配合しています。



タフチモ[®] 配合点眼液「日点」を使用される患者さまへ

点眼液の保管・取扱いで注意すること

- ・ 光を避けて、室温（1～30℃）で保管してください。
- ・ 開封後は、専用の投薬袋に入れてご使用ください。
- ・ 開封後は4週間以内に使用し、残液は使用しないでください。

タフチモ[®] 配合点眼液「日点」の副作用について

以下のような症状があらわれることがあります。

このような症状が続く場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ▶ 目のまわりが黒ずむ | ▶ 息切れ、息苦しさ |
| ▶ まつ毛が伸びる、まつ毛が多くなる | ▶ 脈が減る、脈が途切れる |
| ▶ 黒目（虹彩）の色が変化する | |
| ▶ まぶたのくぼみ | |
| ▶ 充血、目の痛み、目の異物感 | |
| ▶ 目のまわりのアレルギー（かゆみ、腫れや赤くなる） | |