## 製品別比較表

2025年4月改訂

用法・用量 添加物	0.25% ロートニッテ 117.90F 緑内障、高眼圧症 通常、1回1滴、1日2回点眼	ン株式会社 1mL中にニプラジロール 緑内障・高眼圧症 円/1mL 63.80円(1ml 319.00円(5m	i治療剤 18 L) iL)	81.70円/1mL 【標準品と同じ】 【標準品と同じ】	
規 格 薬効分類 薬 価差 1瓶薬価差 効能・効果 所法・用量 添 加 物	117.90F 緑内障、高眼圧症 通常、1回1滴、1日2回点眼	1mL中にニプラジロール 緑内障・高眼圧症 円/1mL 63.80円(1ml 319.00円(5m	i治療剤 18 L) iL)	【標準品と同じ】	
薬効分類 薬 価 薬価差 1瓶薬価差 効能・効果 用法・用量	緑内障、高眼圧症 通常、1回1滴、1日2回点眼	緑内障・高眼圧症 円/1mL 63.80円(1ml 319.00円(5m	i治療剤 18 L) iL)	【標準品と同じ】	
薬価差         1瓶薬価差         効能・効果         用法・用量         添加物	緑内障、高眼圧症 通常、1回1滴、1日2回点眼	円/1mL 63.80円(1ml 319.00円(5m はする。	18 L) iL)	【標準品と同じ】	
薬価差 1瓶薬価差 効能・効果 用法・用量 添加物	緑内障、高眼圧症 通常、1回1滴、1日2回点眼	63.80円(1ml 319.00円(5m とする。	L) IL)	【標準品と同じ】	
1瓶薬価差 効能·効果 用法·用量 添加物	通常、1回1滴、1日2回点眼	319.00円(5m ける。	iL)		
効能·効果 利用法·用量 利添 加 物	通常、1回1滴、1日2回点眼	ける。	· !		
用法・用量 添加物	通常、1回1滴、1日2回点眼				
添加物			ı	【標準品と同じ】	
	ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、	がいません			
担心反人				リン酸二水素K、希塩酸、 ・ルコニウム塩化物液	
規制区分貯法	室温	:分なし 保存 は、遮光して保存すること。)	規制区分なし 室温保存 (外箱開封後は遮光して保存すること。)		
	商品名	性	状		
製品の 性 状	ニプラジロールPF 点眼液0.25%「日点」	性状:無色澄明、無菌水性点眼剤 pH:6.5~7.5		TO GARDETE MEMPRA, COLD TO THE MEMPRA, COLD TO THE MEMPRA, COLD TO THE MEMPRA AND	
	標準品	性状:無色澄明な液(無菌zpH:6.5~7.5 浸透圧比:0.9~1.1	5.		
安定性 *後発品	加速試験(40℃、75%RH、6ヵ月、最終包装製品): いずれの項目(性状、pH、浸透圧比、含量)も規格内				
A TO A TO A PART	【家兎眼房水移行性試験】 家兎の結膜嚢内にニプラジロールPF点眼液0.25%「日点」 とハイパジールコーワ点眼液0.25%をそれぞれ100μL点眼 投与して、家兎眼房水中のニプラジロール濃度を測定した 結果、すべての測定時点において両剤に有意差は認めら れず、生物学的に同等であると判断された。		点。 点。 点。 点。 点。 に した した した の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。	n=6 mean±S.D. t検定	
	【家兎実験的高眼圧モデルに対する効果】 家兎の水負荷による実験的高眼圧モデルを用いて、ニプラジロールPF点眼液0.25%「日点」とハイパジールコーワ点眼液0.25%の眼圧上昇抑制・下降作用を比較した結果、両剤に有意差は認められず、生物学的に同等であると判断された。(Tukeyの多重比較)		-プラ 25.0 点眼 m剤 19.00 両剤 19.00	対照 (n=8) mear±S.D. Tukeyの多慮比較 *:p<0.05、**:p<0.01 (vs対照)	