

ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」を使用される患者さまへ

使用する際に注意すること

このお薬は室温(1～30℃)で保管してください。

このお薬は5mLの容器に2.5mL入っています。

薬液が少なく見えますが、治療に必要な量は十分入っています。

点眼前 手をきれいに洗ってください。

点眼時 1日1回、1滴の点眼です。
決められた点眼回数をお守りください。

※点眼後は目を閉じて、目頭(涙嚢部)を1～5分間、指で軽く押さえてください。

※他の点眼薬も使用する場合には、5分間以上あけてから点眼してください。

点眼後

- 点眼後、目からあふれた点眼液を皮膚についたまま放置しつづけると、少しずつ目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長く、太くなることがあります。
- 点眼液が目のまわりについたときは、すぐにぬらしたティッシュやタオルでふき取るか、目を閉じて洗顔してください。洗顔前や入浴前に点眼することもおすすめてです。



この点眼液は
緑内障・高眼
圧症を治療す
るお薬です。



ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」を使用される患者さまへ

点眼液の保管・取扱いで注意すること

- 光を避けて、室温(1～30℃)で保管してください。
- 開封後は、専用の投薬袋に入れてご使用ください。
- 開封後は4週間以内に使用し、残液は使用しないでください。

その他の注意すること

- 点眼後、目が赤くなることがありますが、そのような症状が続く場合は医師または薬剤師にご相談ください。
- 点眼により、しみる・かゆい・痛いなどの自覚症状が続く場合には、医師の診察を受けるようにしてください。
- 点眼後、一時的に目がかすむことがあります。このような場合には機械類の操作や自動車等の運転はしないようにしてください。
- その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。