

使用する際に注意すること

点眼時

- ・1日1回、1滴の点眼です。決められた点眼回数をお守りください。
- ・他にも点眼薬を使用している場合には、5分以上の間隔をあけてから点眼してください。

点眼後

- ・点眼後、目からあふれた点眼液を皮膚についたまま放置しつづけると、少しずつ目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長く、太くなることがあります。

- ・点眼液が目のまわりについたときは、すぐにぬらしたティッシュやタオルでふき取るか、目を閉じて洗顔してください。

- ・洗顔前や入浴前に点眼することもおすすです。



点眼液の保管・取扱いで注意すること

- ・光を避けて、室温で保存してください。
- ・開封後は、投薬袋に入れてご使用ください。
- ・開封後4週間経過した場合は、残りの点眼液を使用しないでください。
- ・ノズルの穴から針状のもので、絶対に突かないでください。

その他の注意すること


- ・点眼後、目が赤くなることがありますが、そのような症状が続く場合は医師または薬剤師にご相談ください。
- ・点眼により、しみる・かゆい・痛いなどの自覚症状が続く場合には、医師の診察をうけるようにしてください。
- ・点眼後、一時的に目がかすむことがあります。このような場合には機械類の操作や自動車等の運転はしないようにしてください。
- ・その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

ラタノプロストPF 点眼液 0.005% 「日点」 を使用される患者さまへ

未開封品を使用する前に

開栓操作のお願い

※開栓操作を行わないと薬液が出ません。



図のようにキャップを閉めたまま、キャップを上向きにして両手で持ってください。

容器の中央にある丸いマークを両手の親指で強く1回押してください。

容器内部のインナープラグが外れて、点眼可能な状態になります。

防腐剤無添加の緑内障点眼薬です



防腐剤フリーを可能にした特殊容器を使用しているため、容器が大きくなっています。

薬液が少なく見えますが、治療に必要な量(2.5mL)は十分入っています。安心してご使用ください。

点眼方法

- 1 使用する前に、手指を清潔にしてください。
- 2 未開封品を使用する前に開栓操作を行ってください。
- 3 点眼時に容器の先が、目やまぶた、まつ毛に触れないようにしてください。

- 4 容器の丸いマークを親指で押えて、ゆっくり押し点眼してください。




丸いマークをゆっくり押し
てください。
薬液はフィルターを通っ
て出てきます。

- 5 お力の弱い方、ご高齢の方は下記の点眼方法をお勧めします。



丸いマークに親指の第一関節部分を当て、他の指は軽く握って容器を持ち、ゆっくり押しください。



なお、この容器の先端は、確実に1滴が切れるようになっており、真上からでも斜めからでも、液だれせずに点眼できます。