

医薬品の適正な使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

使用上の注意改訂のお知らせ

2018年11月
株式会社日本点眼薬研究所
No.PMS18-2

緑内障・高眼圧症治療剤

チモロールマレイン酸塩点眼液

チモロール PF 点眼液 0.25% 「日点」

チモロール PF 点眼液 0.5% 「日点」

製造販売元：株式会社日本点眼薬研究所

緑内障・高眼圧症治療剤

チモロールマレイン酸塩点眼液

チモレート®点眼液 0.25%

チモレート®点眼液 0.5%

発売元：株式会社日本点眼薬研究所

製造販売元：株式会社ニッテン

この度、標記製品の「使用上の注意」について、自主改訂を行いましたのでお知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂概要】

| 改訂項目 | 改訂概要 |
|------|--------------------------------------|
| 相互作用 | 併用注意の薬剤として、「オミデネパグ イソプロピル」を追加いたしました。 |

《裏面に改訂内容を記載しておりますのでご参照下さい。》

【改訂内容】（新旧対比表）

（ ___：改訂箇所）

| 改訂後(2018年11月改訂) | | | 改 訂 前 | | |
|---|------------------------------|------------------|--|--------------------|---------|
| 3. 相互作用 - 省略 - (変更なし) 併用注意(併用に注意すること) | | | 3. 相互作用 - 省略 - 併用注意(併用に注意すること) | | |
| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 | 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
| オミデネバグ インプロピル | 結膜充血等の眼炎症性副作用の発現頻度の上昇が認められた。 | 機序不明 | アドレナリン ジピペフリン 塩酸塩 | 散瞳作用が助長されたとの報告がある。 | 機序不明 |
| アドレナリン ジピペフリン 塩酸塩 | 散瞳作用が助長されたとの報告がある。 | 機序不明 | - 省略 - | - 省略 - | - 省略 - |
| - 省略 - (変更なし) | - 省略 - (変更なし) | - 省略 - (変更なし) | | | |

【改訂理由】（自主改訂）

先発医薬品と記載を統一するため、自主改訂を行いました。

- DSU(医薬品安全対策情報)No.275 掲載 (2018年12月発行予定)
- 改訂後の添付文書情報は以下のホームページに掲載されます。
 - ・弊社ホームページ (<https://www.nitten-eye.co.jp/>)
 - ・医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)
- 流通の関係上、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに日数を要することがありますので、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

〈お問い合わせ〉

チモロール PF 点眼液 0.25%「日点」
チモロール PF 点眼液 0.5%「日点」

製造販売元

株式会社日本点眼薬研究所

愛知県名古屋市南区西桜町 76 番地

<https://www.nitten-eye.co.jp/>

信頼性保証部法規室

TEL 052-822-5771

<受付時間>9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

チモレート点眼液 0.25%
チモレート点眼液 0.5%

製造販売元

株式会社ニッテン

愛知県名古屋市南区桜本町 40 番地の 2

統括部安全管理室

TEL 052-823-4458

<受付時間>9:00~17:00(土・日・祝日を除く)