

ドルモロール[®] 配合点眼液「日点」を使用される患者さまへ

使用の際に注意すること

点眼前 手をきれいに洗ってください。

点眼時 1日2回、1滴の点眼です。
決められた点眼回数をお守り
ください。
(点眼したときにしみる場合があります。)

点眼後

- ・点眼後は目を閉じて、目がしら(涙嚢部)を1～5分間、指で軽く押さえてください。
- ・点眼液が目のまわりについたときは、ティッシュや清潔なタオルでふき取ってください。



この点眼液は緑内障・高眼圧症を治療するお薬です。

- ・ドルゾラミド塩酸塩
 - ・チモロールマレイン酸塩
- 2つの薬を配合しています。



※他の点眼薬も使用する場合には、5分間以上あけてから点眼してください。

ドルモロール® 配合点眼液「日点」を使用される患者さまへ

点眼液の保管・取扱いで注意すること

- ・ 光を避けて、室温（1～30℃）で保管してください。
- ・ 開封後は、専用の投薬袋に入れてご使用ください。
- ・ 開封後は4週間以内に使用し、残液は使用しないでください。

ドルモロール® 配合点眼液「日点」の副作用について

- ・ 以下のような症状があらわれることがあります。
- | | |
|-------------------------|---------------|
| ▶ 眼刺激症状（しみる、灼熱感、かゆみ等） | ▶ 霧視（眼のかすみ） |
| ▶ 角膜炎（眼の痛み、見えにくい、眼の異物感） | ▶ 息切れ、息苦しさ |
| ▶ 頭痛 | ▶ 脈が減る、脈が途切れる |
| ▶ 結膜充血 | |

このような症状が続く場合は、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。